

■ 死亡率(重症度別)【第3四半期】

H26/04/08

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージⅠ	0.8	1	130
	ステージⅡ	5.6	3	54
	ステージⅢ	9.1	3	33
	ステージⅣ	12.8	25	196
	不明	10.4	25	240
	全体	8.7	57	653
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	23
	ステージⅠ	0.0	0	62
	ステージⅡ	0.0	0	84
	ステージⅢ	1.8	2	109
	ステージⅣ	6.1	12	197
	不明	3.9	10	255
	全体	3.3	24	730
直腸の悪性新生物	ステージ0	5.9	1	17
	ステージⅠ	2.1	1	48
	ステージⅡ	3.2	2	62
	ステージⅢ	1.2	1	83
	ステージⅣ	9.5	8	84
	不明	11.9	13	109
	全体	6.5	26	403
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	2
	ステージⅠ	2.9	3	104
	ステージⅡ	4.7	2	43
	ステージⅢ	14.0	16	114
	ステージⅣ	13.5	34	251
	不明	13.1	57	435
	全体	11.8	112	949
急性心筋梗塞	Killip I	2.4	2	83
	Killip II	3.3	2	61
	Killip III	30.8	8	26
	Killip IV	41.9	13	31
	不明	64.7	11	17
	全体	16.5	36	218
肺炎	軽症	1.6	6	370
	中等症	9.2	13	141
	重症	16.7	101	606
	不明	0.0	0	782
	全体	6.3	120	1899
喘息	重症度の指標なし	0.5	3	613
	不明	N/A	0	0
	全体	0.5	3	613
脳梗塞	JCS 0-1	3.5	22	635
	JCS 2-3	8.8	12	137
	JCS 10-100	16.5	14	85
	JCS 200-300	53.3	16	30
	不明	33.3	5	15
	全体	7.6	69	902
脳出血	JCS 0-1	0.7	1	153
	JCS 2-3	1.4	1	73
	JCS 10-100	14.3	8	56
	JCS 200-300	62.7	52	83
	不明	11.1	1	9
	全体	16.8	63	374
糖尿病	重症度の指標なし	0.9	4	442
	全体	0.9	4	442
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.2	4	338
	全体	1.2	4	338
胃潰瘍	重症度の指標なし	0.5	1	183
	全体	0.5	1	183
急性腸炎	重症度の指標なし	1.1	7	660
	全体	1.1	7	660

■ 死率(重症度別)【第3四半期】

H26/04/08

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	339
	全体	0.0	0	339
胆石症	重症度の指標なし	0.5	4	819
	全体	0.5	4	819
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.6	1	170
	全体	0.6	1	170
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	629
	全体	0.0	0	629
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	51
	全体	0.0	0	51
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	247
	全体	0.0	0	247
狭心症	重症度の指標なし	0.2	3	1233
	全体	0.2	3	1233
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	355
	全体	0.0	0	355
乳房の悪性新生物	ステージⅠ	0.0	0	11
	ステージⅡ	0.0	0	1
	ステージⅢ	0.0	0	102
	ステージⅣ	31.6	6	17
	不明	5.4	9	19
	全体	4.7	15	318
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	221
	全体	0.0	0	221
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	489
	全体	0.0	0	489