

■死亡率(重症度別)【第4四半期】

H26/07/18

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージⅠ	0.5	1	216
	ステージⅡ	5.5	4	73
	ステージⅢ	1.7	1	59
	ステージⅣ	20.0	46	230
	不明	12.7	42	331
	全体	10.3	94	909
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	52
	ステージⅠ	0.0	0	115
	ステージⅡ	1.8	2	114
	ステージⅢ	1.9	3	154
	ステージⅣ	13.9	27	194
	不明	7.9	27	342
	全体	6.1	59	971
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	16
	ステージⅠ	2.4	1	41
	ステージⅡ	0.0	0	47
	ステージⅢ	1.0	1	97
	ステージⅣ	10.6	11	104
	不明	6.3	11	174
	全体	5.0	24	479
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	1.0	1	100
	ステージⅡ	4.3	2	46
	ステージⅢ	6.0	8	134
	ステージⅣ	18.6	54	290
	不明	13.8	63	457
	全体	12.5	128	1027
急性心筋梗塞	KillipⅠ	2.2	3	138
	KillipⅡ	4.0	3	75
	KillipⅢ	15.4	4	26
	KillipⅣ	54.5	24	44
	不明	63.6	14	22
	全体	15.7	48	305
肺炎	軽症	1.5	8	526
	中等症	8.0	14	174
	重症	16.4	173	1052
	不明	0.5	3	649
	全体	8.2	198	2401
喘息	重症度の指標なし	0.6	3	464
	不明	N/A	0	0
	全体	0.6	3	464
脳梗塞	JCS 0-1	4.4	32	724
	JCS 2-3	7.0	14	199
	JCS 10-100	21.1	19	90
	JCS 200-300	63.0	17	27
	不明	26.3	5	19
	全体	8.2	87	1059
脳出血	JCS 0-1	3.3	6	182
	JCS 2-3	4.7	4	86
	JCS 10-100	13.6	12	88
	JCS 200-300	63.1	53	84
	不明	23.8	5	21
	全体	17.4	80	461
糖尿病	重症度の指標なし	0.6	4	683
	全体	0.6	4	683
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	0.8	4	480
	全体	0.8	4	480
胃潰瘍	重症度の指標なし	1.9	3	156
	全体	1.9	3	156
急性腸炎	重症度の指標なし	0.2	1	609
	全体	0.2	1	609

■ 死亡率(重症度別)【第4四半期】

H26/07/18

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	387
	全体	0.0	0	387
胆石症	重症度の指標なし	0.5	5	992
	全体	0.5	5	992
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	116
	全体	0.0	0	116
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	1290
	全体	0.0	0	1290
痔核	重症度の指標なし	1.1	1	91
	全体	1.1	1	91
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	302
	全体	0.0	0	302
狭心症	重症度の指標なし	0.1	2	1671
	全体	0.1	2	1671
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	328
	全体	0.0	0	328
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	18
	ステージⅠ	0.0	0	4
	ステージⅡ	0.8	1	124
	ステージⅢ	0.0	0	15
	ステージⅣ	16.2	6	37
	不明	8.3	17	204
	全体	6.0	24	402
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	234
	全体	0.0	0	234
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	638
	全体	0.0	0	638