

# ■死亡率(重症度別)【第1四半期】

H26/07/18

|               |             | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|---------------|-------------|--------|----------|--------|
| 胃の悪性新生物       | ステージⅠ       | 0.5    | 1        | 208    |
|               | ステージⅡ       | 5.2    | 4        | 77     |
|               | ステージⅢ       | 3.8    | 2        | 53     |
|               | ステージⅣ       | 20.8   | 54       | 260    |
|               | 不明          | 10.1   | 37       | 365    |
|               | 全体          | 10.2   | 98       | 963    |
| 結腸の悪性新生物      | ステージ0       | 0.0    | 0        | 47     |
|               | ステージⅠ       | 2.4    | 2        | 85     |
|               | ステージⅡ       | 3.5    | 3        | 86     |
|               | ステージⅢ       | 0.7    | 1        | 148    |
|               | ステージⅣ       | 9.8    | 20       | 205    |
|               | 不明          | 5.7    | 20       | 348    |
|               | 全体          | 5.0    | 46       | 919    |
| 直腸の悪性新生物      | ステージ0       | 0.0    | 0        | 14     |
|               | ステージⅠ       | 0.0    | 0        | 46     |
|               | ステージⅡ       | 3.8    | 2        | 53     |
|               | ステージⅢ       | 3.0    | 3        | 99     |
|               | ステージⅣ       | 9.0    | 12       | 134    |
|               | 不明          | 9.3    | 14       | 151    |
|               | 全体          | 6.2    | 31       | 497    |
| 気管支および肺の悪性新生物 | ステージ0       | 0.0    | 0        | 2      |
|               | ステージⅠ       | 2.0    | 2        | 102    |
|               | ステージⅡ       | 6.5    | 3        | 46     |
|               | ステージⅢ       | 11.3   | 16       | 142    |
|               | ステージⅣ       | 14.9   | 45       | 302    |
|               | 不明          | 12.7   | 74       | 582    |
|               | 全体          | 11.9   | 140      | 1176   |
| 急性心筋梗塞        | KillipⅠ     | 1.1    | 1        | 95     |
|               | KillipⅡ     | 7.8    | 7        | 90     |
|               | KillipⅢ     | 8.6    | 3        | 35     |
|               | KillipⅣ     | 48.3   | 14       | 29     |
|               | 不明          | 52.2   | 12       | 23     |
|               | 全体          | 13.6   | 37       | 272    |
| 肺炎            | 軽症          | 0.7    | 4        | 555    |
|               | 中等症         | 6.2    | 13       | 210    |
|               | 重症          | 14.8   | 142      | 959    |
|               | 不明          | 0.6    | 4        | 686    |
|               | 全体          | 6.8    | 163      | 2410   |
| 喘息            | 重症度の指標なし    | 0.3    | 2        | 693    |
|               | 不明          | N/A    | 0        | 0      |
|               | 全体          | 0.3    | 2        | 693    |
| 脳梗塞           | JCS 0-1     | 3.0    | 21       | 690    |
|               | JCS 2-3     | 5.5    | 10       | 181    |
|               | JCS 10-100  | 12.5   | 12       | 96     |
|               | JCS 200-300 | 48.4   | 15       | 31     |
|               | 不明          | 36.7   | 11       | 30     |
|               | 全体          | 6.7    | 69       | 1028   |
| 脳出血           | JCS 0-1     | 4.3    | 7        | 162    |
|               | JCS 2-3     | 5.3    | 4        | 75     |
|               | JCS 10-100  | 9.9    | 7        | 71     |
|               | JCS 200-300 | 68.6   | 48       | 70     |
|               | 不明          | 35.7   | 5        | 14     |
|               | 全体          | 18.1   | 71       | 392    |
| 糖尿病           | 重症度の指標なし    | 0.0    | 0        | 770    |
|               | 全体          | 0.0    | 0        | 770    |
| 大腿骨頸部骨折       | 重症度の指標なし    | 1.2    | 6        | 491    |
|               | 全体          | 1.2    | 6        | 491    |
| 胃潰瘍           | 重症度の指標なし    | 1.9    | 3        | 159    |
|               | 全体          | 1.9    | 3        | 159    |
| 急性腸炎          | 重症度の指標なし    | 0.2    | 2        | 843    |
|               | 全体          | 0.2    | 2        | 843    |

# ■ 死亡率(重症度別)【第1四半期】

H26/07/18

|           |          | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|-----------|----------|--------|----------|--------|
| 急性虫垂炎     | 重症度の指標なし | 0.4    | 2        | 502    |
|           | 全体       | 0.4    | 2        | 502    |
| 胆石症       | 重症度の指標なし | 0.2    | 2        | 1001   |
|           | 全体       | 0.2    | 2        | 1001   |
| 前立腺肥大症    | 重症度の指標なし | 0.0    | 0        | 148    |
|           | 全体       | 0.0    | 0        | 148    |
| 白内障       | 重症度の指標なし | 0.0    | 0        | 1215   |
|           | 全体       | 0.0    | 0        | 1215   |
| 痔核        | 重症度の指標なし | 0.0    | 0        | 82     |
|           | 全体       | 0.0    | 0        | 82     |
| 子宮筋腫      | 重症度の指標なし | 0.0    | 0        | 280    |
|           | 全体       | 0.0    | 0        | 280    |
| 狭心症       | 重症度の指標なし | 0.0    | 0        | 1782   |
|           | 全体       | 0.0    | 0        | 1782   |
| 腎結石及び尿管結石 | 重症度の指標なし | 0.0    | 0        | 386    |
|           | 全体       | 0.0    | 0        | 386    |
| 乳房の悪性新生物  | ステージ0    | 0.0    | 0        | 10     |
|           | ステージⅠ    | 0.0    | 0        | 12     |
|           | ステージⅡ    | 0.0    | 0        | 130    |
|           | ステージⅢ    | 3.8    | 1        | 26     |
|           | ステージⅣ    | 27.0   | 10       | 37     |
|           | 不明       | 7.1    | 12       | 170    |
|           | 全体       | 6.0    | 23       | 385    |
| 膝関節症      | 重症度の指標なし | 0.0    | 0        | 295    |
|           | 全体       | 0.0    | 0        | 295    |
| 鼠径ヘルニア    | 重症度の指標なし | 0.0    | 0        | 638    |
|           | 全体       | 0.0    | 0        | 638    |