

■死亡率(重症度別)【第1四半期】

H28/05/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	11
	ステージI	1.3	2	153
	ステージII	3.7	2	54
	ステージIII	11.8	6	51
	ステージIV	13.6	30	220
	不明	11.9	40	337
	全体	9.7	80	826
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	35
	ステージI	0.0	0	92
	ステージII	0.8	1	132
	ステージIII	1.9	4	211
	ステージIV	12.0	24	200
	不明	7.9	26	330
	全体	5.5	55	1000
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	9
	ステージI	2.1	1	47
	ステージII	1.3	1	75
	ステージIII	1.9	2	106
	ステージIV	4.5	7	155
	不明	10.3	20	194
	全体	5.3	31	586
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージI	3.0	2	67
	ステージII	2.4	1	41
	ステージIII	9.0	12	133
	ステージIV	15.0	35	234
	不明	12.9	53	411
	全体	11.6	103	886
急性心筋梗塞	Killip I	1.4	2	145
	Killip II	5.4	4	74
	Killip III	12.5	2	16
	Killip IV	30.8	12	39
	不明	47.6	10	21
	全体	10.2	30	295
肺炎	軽症	1.2	6	486
	中等症	4.2	8	190
	重症	13.8	128	928
	不明	0.1	1	719
	全体	6.2	143	2323
喘息	重症度の指標なし	0.3	2	590
	不明	N/A	0	0
	全体	0.3	2	590
脳梗塞	JCS 0-1	2.0	12	611
	JCS 2-3	3.1	6	192
	JCS 10-100	11.4	10	88
	JCS 200-300	42.1	8	19
	不明	23.5	4	17
	全体	4.3	40	927
脳出血	JCS 0-1	1.9	3	158
	JCS 2-3	4.3	3	70
	JCS 10-100	13.5	10	74
	JCS 200-300	56.8	42	74
	不明	37.5	3	8
	全体	15.9	61	384
糖尿病	重症度の指標なし	0.9	6	649
	全体	0.9	6	649
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	0.3	1	375
	全体	0.3	1	375
胃潰瘍	重症度の指標なし	1.2	2	172
	全体	1.2	2	172
急性腸炎	重症度の指標なし	0.1	1	679

■死亡率(重症度別)【第1四半期】

H28/05/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
	全体	0.1	1	679
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	431
	全体	0.0	0	431
胆石症	重症度の指標なし	0.8	7	932
	全体	0.8	7	932
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	104
	全体	0.0	0	104
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	1240
	全体	0.0	0	1240
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	77
	全体	0.0	0	77
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	155
	全体	0.0	0	155
狭心症	重症度の指標なし	0.1	2	1490
	全体	0.1	2	1490
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	358
	全体	0.0	0	358
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	13
	ステージI	0.0	0	59
	ステージII	1.7	2	120
	ステージIII	0.0	0	14
	ステージIV	31.8	7	22
	不明	5.2	10	191
	全体	4.5	19	419
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	241
	全体	0.0	0	241
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.2	1	622
	全体	0.2	1	622