

■死亡率(重症度別)【第2四半期】

H28/05/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	8
	ステージⅠ	0.5	1	196
	ステージⅡ	6.3	4	64
	ステージⅢ	3.1	2	65
	ステージⅣ	13.3	29	218
	不明	13.0	42	324
	全体	8.9	78	875
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	31
	ステージⅠ	2.0	2	99
	ステージⅡ	1.4	2	141
	ステージⅢ	0.5	1	201
	ステージⅣ	7.2	19	265
	不明	8.8	30	340
	全体	5.0	54	1077
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	12
	ステージⅠ	0.0	0	59
	ステージⅡ	3.8	3	78
	ステージⅢ	2.7	3	110
	ステージⅣ	6.5	10	153
	不明	7.4	15	203
	全体	5.0	31	615
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージⅠ	5.8	5	86
	ステージⅡ	3.0	1	33
	ステージⅢ	6.3	6	96
	ステージⅣ	14.2	37	261
	不明	13.2	54	410
	全体	11.6	103	887
急性心筋梗塞	KillipⅠ	0.7	1	137
	KillipⅡ	2.0	1	50
	KillipⅢ	12.5	2	16
	KillipⅣ	53.7	22	41
	不明	33.3	6	18
	全体	12.2	32	262
肺炎	軽症	1.5	8	532
	中等症	6.2	10	162
	重症	14.7	126	856
	不明	0.3	2	615
	全体	6.7	146	2165
喘息	重症度の指標なし	0.1	1	788
	不明	N/A	0	0
	全体	0.1	1	788
脳梗塞	JCS 0-1	1.7	10	599
	JCS 2-3	6.2	12	195
	JCS 10-100	25.0	19	76
	JCS 200-300	38.9	7	18
	不明	33.3	3	9
	全体	5.7	51	897
脳出血	JCS 0-1	4.5	5	111
	JCS 2-3	5.0	3	60
	JCS 10-100	15.7	8	51
	JCS 200-300	61.2	30	49
	不明	7.7	1	13
	全体	16.5	47	284
糖尿病	重症度の指標なし	1.1	6	567
	全体	1.1	6	567
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.8	8	445
	全体	1.8	8	445
胃潰瘍	重症度の指標なし	0.8	1	133
	全体	0.8	1	133
急性腸炎	重症度の指標なし	0.2	1	643

■死亡率(重症度別)【第2四半期】

H28/05/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
	全体	0.2	1	643
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.2	1	444
	全体	0.2	1	444
胆石症	重症度の指標なし	0.4	4	1039
	全体	0.4	4	1039
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	97
	全体	0.0	0	97
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	1344
	全体	0.0	0	1344
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	79
	全体	0.0	0	79
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	231
	全体	0.0	0	231
狭心症	重症度の指標なし	0.2	3	1439
	全体	0.2	3	1439
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	387
	全体	0.0	0	387
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	6
	ステージI	0.0	0	69
	ステージII	0.8	1	132
	ステージIII	0.0	0	20
	ステージIV	12.0	3	25
	不明	7.4	15	203
	全体	4.2	19	455
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	256
	全体	0.0	0	256
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	614
	全体	0.0	0	614