

# ■死亡率(重症度別)【第2四半期】

H29/02/07

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	6
	ステージⅠ	0.6	1	156
	ステージⅡ	2.3	1	43
	ステージⅢ	8.9	5	56
	ステージⅣ	18.0	29	161
	不明	12.0	30	250
	全体	9.8	66	672
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	27
	ステージⅠ	0.0	0	84
	ステージⅡ	1.7	2	116
	ステージⅢ	2.3	3	129
	ステージⅣ	8.8	19	215
	不明	7.7	21	273
	全体	5.3	45	844
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	11
	ステージⅠ	2.4	1	41
	ステージⅡ	1.6	1	64
	ステージⅢ	1.3	1	75
	ステージⅣ	6.4	11	171
	不明	9.4	17	181
	全体	5.7	31	543
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	4.5	3	67
	ステージⅡ	5.6	1	18
	ステージⅢ	13.6	6	44
	ステージⅣ	24.7	42	170
	不明	12.4	44	354
	全体	14.7	96	653
急性心筋梗塞	KillipⅠ	3.8	5	132
	KillipⅡ	2.7	1	37
	KillipⅢ	38.5	5	13
	KillipⅣ	54.1	20	37
	不明	41.7	5	12
	全体	15.6	36	231
肺炎	軽症	2.2	10	459
	中等症	3.2	6	185
	重症	12.6	94	748
	不明	0.0	0	498
	全体	5.8	110	1890
喘息	重症度の指標なし	0.0	0	286
	不明	N/A	0	0
	全体	0.0	0	286
脳梗塞	JCS 0-1	3.0	15	506
	JCS 2-3	7.9	13	165
	JCS 10-100	15.9	11	69
	JCS 200-300	36.8	7	19
	不明	23.5	4	17
	全体	6.4	50	776
脳出血	JCS 0-1	0.0	0	93
	JCS 2-3	5.8	3	52
	JCS 10-100	10.5	4	38
	JCS 200-300	54.3	25	46
	不明	10.0	1	10
	全体	13.8	33	239
糖尿病	重症度の指標なし	0.0	0	418
	全体	0.0	0	418
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	0.6	2	325
	全体	0.6	2	325
胃潰瘍	重症度の指標なし	0.0	0	109
	全体	0.0	0	109
急性腸炎	重症度の指標なし	0.3	2	590
	全体	0.3	2	590

# ■ 死亡率(重症度別)【第2四半期】

H29/02/07

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.3	1	373
	全体	0.3	1	373
胆石症	重症度の指標なし	0.6	6	928
	全体	0.6	6	928
前立腺肥大症	重症度の指標なし	1.1	1	89
	全体	1.1	1	89
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	1215
	全体	0.0	0	1215
痔核	重症度の指標なし	1.8	1	55
	全体	1.8	1	55
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	167
	全体	0.0	0	167
狭心症	重症度の指標なし	0.1	1	1115
	全体	0.1	1	1115
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.3	1	339
	全体	0.3	1	339
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	9
	ステージⅠ	0.0	0	43
	ステージⅡ	0.0	0	108
	ステージⅢ	0.0	0	9
	ステージⅣ	10.0	3	30
	不明	4.7	9	192
	全体	3.1	12	391
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	182
	全体	0.0	0	182
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	484
	全体	0.0	0	484