

■死亡率(重症度別)【第3四半期】

H29/06/27

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	8
	ステージI	0.5	1	188
	ステージII	2.1	1	47
	ステージIII	11.8	4	34
	ステージIV	11.9	16	134
	不明	9.1	25	275
	全体	6.9	47	686
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	41
	ステージI	1.3	1	78
	ステージII	0.0	0	108
	ステージIII	2.0	3	151
	ステージIV	8.1	15	185
	不明	6.5	20	306
	全体	4.5	39	869
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	12
	ステージI	0.0	0	44
	ステージII	0.0	0	45
	ステージIII	0.0	0	78
	ステージIV	5.8	7	121
	不明	11.0	19	172
	全体	5.5	26	472
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージI	2.2	1	46
	ステージII	11.1	2	18
	ステージIII	6.6	5	76
	ステージIV	19.3	34	176
	不明	16.8	62	368
	全体	15.2	104	684
急性心筋梗塞	Killip I	2.2	3	139
	Killip II	8.5	4	47
	Killip III	29.2	7	24
	Killip IV	65.1	28	43
	不明	50.0	3	6
	全体	17.4	45	259
肺炎	軽症	2.3	12	531
	中等症	6.7	13	194
	重症	12.7	115	909
	不明	0.1	1	676
	全体	6.1	141	2310
喘息	重症度の指標なし	0.6	3	500
	不明	N/A	0	0
	全体	0.6	3	500
脳梗塞	JCS 0-1	1.4	8	558
	JCS 2-3	7.5	14	187
	JCS 10-100	21.3	16	75
	JCS 200-300	41.2	7	17
	不明	33.3	4	12
	全体	5.8	49	849
脳出血	JCS 0-1	4.1	5	123
	JCS 2-3	4.6	3	65
	JCS 10-100	7.1	4	56
	JCS 200-300	66.7	32	48
	不明	44.4	4	9
	全体	15.9	48	301
糖尿病	重症度の指標なし	0.4	2	462
	全体	0.4	2	462
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	2.1	8	382
	全体	2.1	8	382
胃潰瘍	重症度の指標なし	2.1	3	141
	全体	2.1	3	141
急性腸炎	重症度の指標なし	0.4	2	568

■死亡率(重症度別)【第3四半期】

H29/06/27

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
	全体	0.4	2	568
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	325
	全体	0.0	0	325
胆石症	重症度の指標なし	0.4	4	948
	全体	0.4	4	948
前立腺肥大症	重症度の指標なし	1.1	1	88
	全体	1.1	1	88
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	1091
	全体	0.0	0	1091
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	64
	全体	0.0	0	64
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	169
	全体	0.0	0	169
狭心症	重症度の指標なし	0.1	1	1333
	全体	0.1	1	1333
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	271
	全体	0.0	0	271
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	10
	ステージI	0.0	0	58
	ステージII	1.0	1	102
	ステージIII	0.0	0	6
	ステージIV	6.7	2	30
	不明	4.1	10	246
	全体	2.9	13	452
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	218
	全体	0.0	0	218
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	487
	全体	0.0	0	487