



## ■ 死亡率(重症度別)【年間】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)	標準偏差	信頼区間(95.0%)
気管支および肺の悪 性新生物	ステージ0	0.0	0	3	0.0	0.0
	ステージI	3.4	7	208	18.1	2.5
	ステージII	8.1	6	74	27.5	6.4
	ステージIII	10.7	30	280	31.0	3.6
	ステージIV	22.3	150	674	41.6	3.1
	不明	13.3	193	1447	34.0	1.8
	全体	14.4	386	2686	35.1	1.3



## ■ 死亡率(重症度別)【年間】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)	標準偏差	信頼区間(95.0%)
急性心筋梗塞	Killip I	3.6	19	530	18.6	1.6
	Killip II	3.6	7	193	18.7	2.7
	Killip III	30.6	22	72	46.4	10.9
	Killip IV	60.0	93	155	49.1	7.8
	不明	44.0	22	50	50.1	14.3
	全体	16.3	163	1000	37.0	2.3



## ■ 死亡率(重症度別)【年間】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)	標準偏差	信頼区間(95.0%)
脳出血	JCS 0-1	2.8	13	459	16.6	1.5
	JCS 2-3	4.1	10	244	19.9	2.5
	JCS 10-100	13.6	32	236	34.3	4.4
	JCS 200-300	59.9	115	192	49.1	7.0
	不明	23.5	8	34	43.1	15.0
	全体	15.3	178	1165	36.0	2.1

