

■死亡率(重症度別)【第1四半期】

H30/03/05

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	5
	ステージI	0.7	1	138
	ステージII	0.0	0	42
	ステージIII	3.0	1	33
	ステージIV	29.1	32	110
	不明	13.1	33	252
	全体	11.6	67	580
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	24
	ステージI	0.0	0	64
	ステージII	1.6	2	123
	ステージIII	1.2	2	162
	ステージIV	6.5	13	199
	不明	3.6	11	304
	全体	3.2	28	876
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	18
	ステージI	2.6	1	39
	ステージII	3.5	2	57
	ステージIII	3.8	3	80
	ステージIV	8.0	8	100
	不明	3.0	6	201
	全体	4.0	20	495
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	3
	ステージI	4.1	2	49
	ステージII	6.5	2	31
	ステージIII	4.8	5	104
	ステージIV	12.6	25	199
	不明	12.8	48	374
	全体	10.8	82	760
急性心筋梗塞	Killip I	4.1	5	122
	Killip II	6.3	3	48
	Killip III	20.0	3	15
	Killip IV	51.7	15	29
	不明	37.5	6	16
	全体	13.9	32	230
肺炎	軽症	3.0	16	526
	中等症	6.0	14	234
	重症	12.6	131	1038
	不明	0.2	1	520
	全体	7.0	162	2318
喘息	重症度の指標なし	0.4	2	463
	全体	0.4	2	463
脳梗塞	JCS 0-1	2.5	18	711
	JCS 2-3	5.6	12	216
	JCS 10-100	13.3	15	113
	JCS 200-300	40.0	10	25
	不明	N/A	0	0
	全体	5.2	55	1065
脳出血	JCS 0-1	3.1	5	160
	JCS 2-3	5.2	5	97
	JCS 10-100	12.9	11	85
	JCS 200-300	70.7	41	58
	不明	N/A	0	0
	全体	15.5	62	400
糖尿病	重症度の指標なし	0.9	5	576
	全体	0.9	5	576
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.4	6	424
	全体	1.4	6	424
胃潰瘍	重症度の指標なし	1.5	2	130
	全体	1.5	2	130
急性腸炎	重症度の指標なし	0.6	4	692
	全体	0.6	4	692

■ 死亡率(重症度別)【第1四半期】

H30/03/05

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	396
	全体	0.0	0	396
胆石症	重症度の指標なし	0.5	5	954
	全体	0.5	5	954
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	77
	全体	0.0	0	77
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	1105
	全体	0.0	0	1105
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	72
	全体	0.0	0	72
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	147
	全体	0.0	0	147
狭心症	重症度の指標なし	0.2	2	1199
	全体	0.2	2	1199
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.3	1	296
	全体	0.3	1	296
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	9
	ステージI	0.0	0	42
	ステージII	0.0	0	99
	ステージIII	0.0	0	16
	ステージIV	7.7	2	26
	不明	3.0	5	166
	全体	2.0	7	358
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	138
	全体	0.0	0	138
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	500
	全体	0.0	0	500