

■死亡率(重症度別)【第2四半期】

H30/03/05

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージⅠ	1.2	2	170
	ステージⅡ	7.0	3	43
	ステージⅢ	9.5	4	42
	ステージⅣ	14.0	17	121
	不明	12.8	30	235
	全体	9.2	56	612
結腸の悪性新生物	ステージ0	3.7	1	27
	ステージⅠ	3.5	2	57
	ステージⅡ	1.5	2	134
	ステージⅢ	2.4	4	164
	ステージⅣ	7.6	14	184
	不明	8.1	25	308
	全体	5.5	48	874
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	6
	ステージⅠ	1.8	1	56
	ステージⅡ	1.8	1	56
	ステージⅢ	1.2	1	83
	ステージⅣ	4.0	4	100
	不明	9.7	15	154
	全体	4.8	22	455
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージⅠ	0.0	0	68
	ステージⅡ	6.9	2	29
	ステージⅢ	11.4	12	105
	ステージⅣ	13.9	32	231
	不明	9.9	40	404
	全体	10.3	86	838
急性心筋梗塞	KillipⅠ	2.3	3	132
	KillipⅡ	7.9	3	38
	KillipⅢ	34.8	8	23
	KillipⅣ	61.3	19	31
	不明	14.3	1	7
	全体	14.7	34	231
肺炎	軽症	1.9	8	415
	中等症	4.9	10	204
	重症	11.5	98	849
	不明	0.2	1	403
	全体	6.3	117	1871
喘息	重症度の指標なし	0.4	2	463
	全体	0.4	2	463
脳梗塞	JCS 0-1	2.4	15	638
	JCS 2-3	4.0	8	200
	JCS 10-100	16.5	15	91
	JCS 200-300	33.3	9	27
	不明	N/A	0	0
	全体	4.9	47	956
脳出血	JCS 0-1	2.8	4	144
	JCS 2-3	11.5	6	52
	JCS 10-100	12.5	9	72
	JCS 200-300	58.3	42	72
	不明	N/A	0	0
	全体	17.9	61	340
糖尿病	重症度の指標なし	0.4	2	528
	全体	0.4	2	528
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	0.9	3	350
	全体	0.9	3	350
胃潰瘍	重症度の指標なし	3.7	4	107
	全体	3.7	4	107
急性腸炎	重症度の指標なし	0.9	5	581
	全体	0.9	5	581

■ 死亡率(重症度別)【第2四半期】

H30/03/05

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	418
	全体	0.0	0	418
胆石症	重症度の指標なし	1.0	10	995
	全体	1.0	10	995
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	86
	全体	0.0	0	86
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	1045
	全体	0.0	0	1045
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	61
	全体	0.0	0	61
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	183
	全体	0.0	0	183
狭心症	重症度の指標なし	0.1	1	1168
	全体	0.1	1	1168
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	341
	全体	0.0	0	341
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	12
	ステージⅠ	0.0	0	38
	ステージⅡ	0.0	0	108
	ステージⅢ	0.0	0	20
	ステージⅣ	0.0	0	27
	不明	3.6	6	167
	全体	1.6	6	372
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	152
	全体	0.0	0	152
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	533
	全体	0.0	0	533