

■死亡率(重症度別)【第1四半期】

2020/06/23

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	6
	ステージI	3.6	8	220
	ステージII	10.5	4	38
	ステージIII	6.1	3	49
	ステージIV	19.7	28	142
	不明	25.8	60	233
	全体	15.0	103	688
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	26
	ステージI	1.1	1	94
	ステージII	3.2	4	124
	ステージIII	2.7	5	182
	ステージIV	9.0	17	188
	不明	13.1	45	343
	全体	7.5	72	957
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	13
	ステージI	0.0	0	48
	ステージII	2.7	1	37
	ステージIII	2.4	3	126
	ステージIV	7.5	5	67
	不明	14.5	31	214
	全体	7.9	40	505
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージI	1.1	1	92
	ステージII	4.4	2	45
	ステージIII	13.1	13	99
	ステージIV	16.4	42	256
	不明	20.4	96	471
	全体	16.0	154	963
急性心筋梗塞	Killip I	1.8	3	170
	Killip II	3.1	2	64
	Killip III	8.3	2	24
	Killip IV	54.3	19	35
	不明	14.3	4	28
	全体	9.3	30	321
肺炎	軽症	3.1	19	611
	中等症	7.3	20	273
	重症	12.1	127	1049
	不明	0.0	0	214
	全体	7.7	166	2147
喘息	重症度の指標なし	0.0	0	283
	全体	0.0	0	283
脳梗塞	JCS 0-1	2.2	27	1227
	JCS 2-3	7.0	27	383
	JCS 10-100	16.7	25	150
	JCS 200-300	43.5	10	23
	不明	N/A	0	0
	全体	5.0	89	1783
脳出血	JCS 0-1	1.3	4	304
	JCS 2-3	3.5	5	142
	JCS 10-100	7.3	9	123
	JCS 200-300	60.0	48	80
	不明	N/A	0	0
	全体	10.2	66	649
糖尿病	重症度の指標なし	1.1	7	635
	全体	1.1	7	635
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.7	8	474
	全体	1.7	8	474
胃潰瘍	重症度の指標なし	2.4	3	124
	全体	2.4	3	124
急性腸炎	重症度の指標なし	0.8	5	610
	全体	0.8	5	610

■死亡率(重症度別)【第1四半期】

2020/06/23

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.2	1	438
	全体	0.2	1	438
胆石症	重症度の指標なし	1.0	10	994
	全体	1.0	10	994
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	107
	全体	0.0	0	107
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	1121
	全体	0.0	0	1121
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	83
	全体	0.0	0	83
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	166
	全体	0.0	0	166
狭心症	重症度の指標なし	0.3	5	1497
	全体	0.3	5	1497
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	350
	全体	0.0	0	350
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	13
	ステージI	0.0	0	116
	ステージII	0.9	1	111
	ステージIII	0.0	0	30
	ステージIV	24.0	6	25
	不明	18.2	18	99
	全体	6.3	25	394
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	287
	全体	0.0	0	287
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	563
	全体	0.0	0	563