■死亡率(重症度別)【年間】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
 胃の悪性新生物	ステージ0	3.8	1	26
日が応圧利工物	ステージI	1.3	8	593
	ステージⅡ	6.1	11	180
	ステージ皿	3.6	8	224
	ステージⅣ	15.5	70	452
	不明	16.2	178	1098
	全体	10.7	276	2573
結腸の悪性新生物	ステージO	0.7	1	140
	ステージ I	0.9	3	318
	ステージⅡ	2.3	11	484
	ステージⅢ	3.4	23	685
	ステージⅣ	10.7	70	655
	不明	10.9	165	1513
	全体	7.2	273	3795
直腸の悪性新生物	ステージO	2.3	1	43
	ステージ I	0.0	0	230
	ステージⅡ	3.2	6	188
	ステージⅢ	2.4	9	377
	ステージⅣ	8.2	29	352
	不明	10.7	78	731
	全体	6.4	123	1921
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	17
	ステージ I	6.2	13	211
	ステージⅡ	4.3	7	163
	ステージ皿	9.3	24	257
	ステージIV	17.4	135	775
	不明	21.3	345	1619
	全体	17.2	524	3042
急性心筋梗塞	Killip I	2.4	15	623
	Killip II	6.6	22	331
	Killip Ⅲ	21.7	25	115
	KillipIV	46.3	99	214
	不明	45.6	67	147
ロナ・ル [*]	全体	15.9	228	1431
肺炎	軽症	7.1	115	1620
	中等症	9.6	80	830
	重症 不明	20.6	575	2790
	全体	5.0	6	121
	<u> 王体 </u>	14.5	776	5361 456
响总	全体	1.5	7	456
	JCS 0-1	1.7	118	6811
脳快基	JCS 2-3	6.8	140	2047
	JCS 10-100	16.0	118	738
	JCS 200-300	40.9	67	164
	不明	N/A	0	0
	全体	4.5	443	9760
脳出血	JCS 0-1	2.0	33	1660
11 page 11 page 12 pag	JCS 2-3	6.5	50	767
	JCS 10-100	14.0	89	637
	JCS 200-300	58.4	275	471
	不明	N/A	0	0
	全体	12.6	447	3535
糖尿病	重症度の指標なし	1.7	36	2081
	全体	1.7	36	2081
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.2	30	2600
	全体	1.2	30	2600
胃潰瘍		1.2	6	508
	全体	1.2	6	508
急性腸炎				
急性腸炎	重症度の指標なし	1.2	19	1629

■死亡率(重症度別)【年間】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	1983
	全体	0.0	0	1983
胆石症	重症度の指標なし	1.1	46	4360
	全体	1.1	46	4360
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	604
	全体	0.0	0	604
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	5007
	全体	0.0	0	5007
痔核	重症度の指標なし	0.3	1	358
	全体	0.3	1	358
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	728
	全体	0.0	0	728
狭心症	重症度の指標なし	0.3	18	5178
	全体	0.3	18	5178
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.3	6	1929
	全体	0.3	6	1929
乳房の悪性新生物	ステージO	0.0	0	54
	ステージ I	0.2	1	529
	ステージⅡ	0.7	4	541
	ステージⅢ	3.6	5	138
	ステージⅣ	10.8	10	93
	不明	11.7	51	435
	全体	4.0	71	1790
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	1608
	全体	0.0	0	1608
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	1	2254
	全体	0.0	1	2254