

■死亡率(重症度別)【第4四半期】

2023/06/26

| | | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|---------------|-------------|--------|----------|--------|
| 胃の悪性新生物 | ステージ0 | N/A | 0 | 0 |
| | ステージI | 0.0 | 0 | 2 |
| | ステージII | 0.0 | 0 | 1 |
| | ステージIII | 0.0 | 0 | 4 |
| | ステージIV | 0.0 | 0 | 3 |
| | 不明 | 50.0 | 3 | 6 |
| | 全体 | 18.8 | 3 | 16 |
| 結腸の悪性新生物 | ステージ0 | N/A | 0 | 0 |
| | ステージI | 0.0 | 0 | 9 |
| | ステージII | 0.0 | 0 | 5 |
| | ステージIII | 0.0 | 0 | 3 |
| | ステージIV | 18.2 | 2 | 11 |
| | 不明 | 13.3 | 2 | 15 |
| | 全体 | 9.3 | 4 | 43 |
| 直腸の悪性新生物 | ステージ0 | N/A | 0 | 0 |
| | ステージI | N/A | 0 | 0 |
| | ステージII | 0.0 | 0 | 4 |
| | ステージIII | 0.0 | 0 | 1 |
| | ステージIV | 0.0 | 0 | 4 |
| | 不明 | 16.7 | 1 | 6 |
| | 全体 | 6.7 | 1 | 15 |
| 気管支および肺の悪性新生物 | ステージ0 | N/A | 0 | 0 |
| | ステージI | N/A | 0 | 0 |
| | ステージII | N/A | 0 | 0 |
| | ステージIII | 0.0 | 0 | 1 |
| | ステージIV | 25.0 | 2 | 8 |
| | 不明 | 35.7 | 5 | 14 |
| | 全体 | 30.4 | 7 | 23 |
| 急性心筋梗塞 | Killip I | 0.0 | 0 | 2 |
| | Killip II | N/A | 0 | 0 |
| | Killip III | 0.0 | 0 | 1 |
| | Killip IV | N/A | 0 | 0 |
| | 不明 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 4 |
| 肺炎 | 軽症 | 0.0 | 0 | 18 |
| | 中等症 | 28.6 | 2 | 7 |
| | 重症 | 19.0 | 12 | 63 |
| | 不明 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 全体 | 15.7 | 14 | 89 |
| 喘息 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 6 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 6 |
| 脳梗塞 | JCS 0-1 | 4.0 | 3 | 75 |
| | JCS 2-3 | 14.8 | 4 | 27 |
| | JCS 10-100 | 11.1 | 1 | 9 |
| | JCS 200-300 | 100.0 | 2 | 2 |
| | 不明 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 8.8 | 10 | 113 |
| 脳出血 | JCS 0-1 | 0.0 | 0 | 23 |
| | JCS 2-3 | 0.0 | 0 | 11 |
| | JCS 10-100 | 66.7 | 2 | 3 |
| | JCS 200-300 | 66.7 | 4 | 6 |
| | 不明 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 14.0 | 6 | 43 |
| 糖尿病 | 重症度の指標なし | 3.2 | 1 | 31 |
| | 全体 | 3.2 | 1 | 31 |
| 大腿骨頸部骨折 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 56 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 56 |
| 胃潰瘍 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 4 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 4 |
| 急性腸炎 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 21 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 21 |

■死亡率(重症度別)【第4四半期】

2023/06/26

| | | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|-----------|----------|--------|----------|--------|
| 急性虫垂炎 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 20 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 20 |
| 胆石症 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 68 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 68 |
| 前立腺肥大症 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 9 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 9 |
| 白内障 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 20 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 20 |
| 痔核 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 6 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 6 |
| 子宮筋腫 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 14 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 14 |
| 狭心症 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 8 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 8 |
| 腎結石及び尿管結石 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 13 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 13 |
| 乳房の悪性新生物 | ステージ0 | N/A | 0 | 0 |
| | ステージI | 0.0 | 0 | 2 |
| | ステージII | 0.0 | 0 | 1 |
| | ステージIII | 0.0 | 0 | 2 |
| | ステージIV | 25.0 | 1 | 4 |
| | 不明 | 50.0 | 2 | 4 |
| | 全体 | 23.1 | 3 | 13 |
| 膝関節症 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 37 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 37 |
| 鼠径ヘルニア | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 39 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 39 |